

IMPORTANT : Gardez cette Fiche informative, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Cette Fiche informative n'a aucune valeur officielle et ne remplace pas les conseils et informations que pourrait vous donner votre Médecin ou Pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette Fiche informative, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE LE BUDESONIDE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement des œsophagites à éosinophile.

Il peut être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez au médecin qui suit votre enfant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LE BUDESONIDE ?

Contre-indications et précautions d'emploi

Ce médicament est contre-indiqué dans les situations suivantes : Hypersensibilité au BUDESONIDE

Le traitement ne doit pas être interrompu sans avis médical.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Il est déconseillé d'associer le budesonide avec Amitriptiline, Tamoxifene et Verapamil

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER LE BUDESONIDE ?

Instructions pour un bon usage de la solution pédiatrique.

Le flacon dispose d'un bouchon seringue pour prélever la dose directement dans le flacon. Le mode d'emploi est le suivant :

- Bien agiter le flacon avant de s'en servir
 - Introduire la seringue dans l'endroit prévu à cet effet sur le bouchon
 - Bien enfoncer la seringue et retourner le flacon à l'envers. Attention, bien tenir le flacon et la seringue dans la main afin d'éviter que la seringue ne sorte de son emplacement
 - A l'aide de la seringue, retirer un peu plus que la quantité souhaitée
 - Repousser la quantité en trop dans le flacon en le gardant à l'envers pour éviter qu'il n'y ait trop d'air dans la seringue
 - Reposer le flacon à l'endroit et retirer délicatement la seringue. Refermer le bouchon puis administrer à l'enfant la dose nécessaire
- Bien rincer la seringue à l'eau après chaque utilisation

Ne pas boire ni manger pendant une heure après la prise de BUDESONIDE

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale. Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer la prescription médicale de votre enfant.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, BUDESONIDE est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que asténie, gêne buccale, candidose

Si vous remarquez des effets indésirables mentionnés ou non dans cette notice, veuillez en informer rapidement votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LE BUDESONIDE ?

Conditions de conservation

Conserver au sec, à température ambiante.

Tenir hors de portée des enfants.

Péremption

Se référer au conditionnement de votre préparation.

Gel de budésonide à 0.25 mg/ml

Préparation n° :

Posologie : ml fois/jour

Attention

Conservation : 30 jours à température ambiante

Conserver à l'abri de la lumière

Système d'administration

Mode d'emploi :

- 1- Mélanger par retournement avant usage,
- 2- Ouvrir le flacon, tenir le flacon droit
- 3- Adapter la seringue graduée sur le bouchon,
- 4- Retourner le flacon afin que la seringue soit sous le flacon,
- 5- Aspirer le volume nécessaire, retourner et poser le flacon puis désadapter la seringue
- 6- Administrer le médicament
- 7- Après utilisation, rincer la seringue à l'eau claire
- 8- Refermer le flacon

